

Transcurridos ya unos meses del tercer año de mandato de la actual Junta Directiva de la Sociedad, deseo comunicar a todos los asociados algunas modificaciones habidas en su composición, así como algunas novedades producidas en los últimos meses en cuestiones importantes que interesan a todos.

Por lo que se refiere al primer punto y por imperativo estatutario, el Dr. J. Jiménez Guillén debe dejar su cargo de Vicepresidente segundo de nuestra Sociedad, al haber sido elegido como Presidente de la Autonómica Murciana. Desde aquí quiero alabar la gran labor realizada por el Dr. Jiménez Guillén y su decisiva participación en estos difíciles tiempos de iniciación de SEMES, amén de manifestarle mi afecto y mi gratitud.

Este puesto será ahora ocupado por el Dr. Santiago Serrano, Jefe de la Sección de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela de quien, dada su capacidad, energía y dedicación, todos hemos de esperar lo mejor.

Quiero también desde aquí despedir, manifestándole mi agradecimiento y mi amistad, al Sr. U. García Arias quien, por cuestiones personales, me ha solicitado dejar su puesto de Vocal de Técnicos.

El segundo tema que quiero comentar se refiere a la modificación de la sede para nuestro V Congreso Nacional. Como ya es conocido, la decisión de hacerlo coincidir con un encuentro Internacional ha aconsejado, por cuestiones logísticas y capacidad hotelera, trasladarlo a Madrid. Con independencia de ello, creo que debo destacar la importancia que espero ha de tener este Congreso en el futuro de nuestra Sociedad, en el sentido de iniciar una etapa de relación con otras sociedades afines e inserción en ambientes internacionales.

Por último, esta Revista que tienes en tus manos indica que hemos tomado una decisión que, espero, ayudará a conseguir uno de los puntos programáticos más caros a esta Junta: lograr que EMERGENCIAS sea una publicación modélica en lo formal y todo lo buena en su contenido como seamos capaces de hacer entre todos.

En esta nueva etapa asumirá la Dirección el Dr. J. Camp. Quienes conocemos su capacidad de trabajo y su sólida formación científica no dudamos de haber acertado en la elección.

En este momento quiero positivamente expresar mi admiración, gratitud y amistad por el Dr. A. Hernando, quien tuvo la bondad y la valentía de hacerse cargo de la dirección de la Revista en sus momentos iniciales, venciendo todas las dificultades propias de tales circunstancias. Por fortuna, continuará trabajando y aportando su experiencia desde el Consejo Editorial, ente que, junto con el Director y Redactores, ha de desempeñar un importante papel en el diseño de lo que EMERGENCIAS ha de ser en el futuro desde el punto de vista conceptual.

Motivo de especial satisfacción ha sido la aceptación del Dr. E. Moreno para integrarse así mismo en el Consejo Editorial. En los últimos meses nuestra Sociedad ha crecido extraordinariamente y como cabe la posibilidad de que alguno de nuestros nuevos asociados no le conozca, considero un deber explicarles que el Dr. E. Moreno, primer Presidente de SEMES, constituye un punto de referencia ineludible para cualquier valoración de la Medicina de Urgencias y Emergencias en nuestro país, y muy concretamente para la existencia de nuestra Sociedad y que hemos de sentirnos todos satisfechos y agradecidos de su colaboración y compañía.

Espero con todo ello que esta nueva etapa de nuestra Revista que se inicia con este número, sirva para alcanzar las cotas de calidad a que todos aspiramos. Disfrutamos para ello con la dedicación de la Dirección, Redactores, Consejo Editorial y Comité de Redacción, ayudados así mismo por la solidez y la experiencia de la nueva Editorial Punto Médico y de todas las personas que en ella trabajan, y por el trabajo y la colaboración de todos los asociados, sin lo cual nada de lo que hasta aquí se ha venido comentando tendría sentido.

J. Millá

Presidente

COMPOSICION:

1 g de pomada contiene: Sal sódica de éster poliholósido sulfúrico (Thrombocid), 1 mg. Timol, 1 mg. Excipiente y conservadores c.s.

PROPIEDADES:

Contrariamente a la heparina natural y a otros heparinoides, la molécula de Thrombocid tiene un peso molecular muy bajo (alrededor de 3.000) lo que proporciona unas condiciones muy favorables para su absorción a través de la piel y mucosas. En Thrombocid pomada el excipiente especial adoptado asegura su eficacia a través de una absorción cuantitativa. Las acciones de Thrombocid que justifican su uso en pomada son:

- Actúa sobre los trombos y depósitos de fibrina por activación de la fibrinolisis.
- Acción antiinflamatoria por inhibición de la hialuronidasa.
- Aumento del riego sanguíneo y eliminación de las sustancias tóxicas.

Estos efectos se producen ya a concentraciones muy pequeñas y explican la mejoría observada mediante la aplicación de Thrombocid pomada.

INDICACIONES:

Son numerosas y abarcan diversos tipos de inflamación, hematomas, trombosis y edemas locales, entre los que se encuentran:

- Flebitis, varices con todas sus consecuencias.
- Edemas e inflamaciones post-trombóticas.
- Inflamaciones e infiltraciones, panadizos, forúnculos, tendovaginitis, bursitis, etc.
- Hematomas, contusiones, distorsiones.
- Congelaciones, sabañones.
- Quemaduras térmicas y solares.
- Picaduras de insectos.



Primer tratamiento de base circulatorio

Antiinflamatorio y fibrinolítico



INDICACIONES: Traumatismos • Contusiones y hematomas en los estados anterior y posterior a su reducción • Varicosidades

Estimados compañeros y compañeras: Desde nuestra querida Revista EMERGENCIAS, que he tenido el gusto de dirigir, me pongo en contacto con todos vosotros para agradecer, ante todo, el trabajo común durante la etapa transcurrida, mediante vuestras aportaciones en forma de trabajos, sugerencias y colaboraciones de todo tipo que han servido, a mi juicio, para mantenernos en contacto, intercambiar experiencias y de estimularnos para trabajar por una asistencia médica a las urgencias y emergencias, cada día más profesionalizada y de mejor calidad.

Por mi parte, considero un privilegio el que la Junta Directiva de la SEMES, presidida, durante sus cortos aunque fructíferos años de existencia, por nuestros queridos compañeros los doctores Moreno Millán inicialmente y Millá Santos en la actualidad, hayan confiado a mi humilde esfuerzo la Dirección de la Revista.

Pienso de común acuerdo con la Junta Directiva de SEMES que, en la nueva etapa que comienza para EMERGENCIAS, bajo el soporte técnico de la Editorial Punto Médico, sería conveniente un relevo en la Dirección de la Revista y en ese sentido, la experiencia, ilusión, prestigio y capacidad de trabajo del Dr. J. Camp, son la mejor garantía de que la línea que seguirá EMERGENCIAS marcará el camino del esfuerzo común por un desarrollo satisfactorio para todos nosotros de la medicina en situaciones agudas.

Quiero agradecer también de una manera especial al Comité de Redacción, presidido por el Dr. A. Bertrán y a la Editorial Edimer su esfuerzo durante estos años, por el intento de una mejora de la calidad formal y del contenido de la Revista, ya que me consta la dedicación que han puesto en este sentido.

Como despedida, quisiera terminar pidiéndoos a todos una colaboración continuada, para que EMERGENCIAS constituya un cemento entre médicos, enfermeros y enfermeras, técnicos en emergencias y todos los que creemos que la solidez del edificio de la asistencia médica urgente en España la construimos día a día entre todos nosotros.

A.E. Hernando Lorenzo

las equimosis de origen traumático

con rápida penetración percutánea



mas traumáticos • Esguinces y distensiones • Luxaciones:
is, tromboflebitis • Úlceras varicosas • Insuficiencia venosa

En podología:
- Infiltraciones inflamatorias de las uñas, callosidades, verrugas plantares, juanetes, molestias de los pies planos y de otras malformaciones, etc.

En proctología:
- Tratamiento local de las afecciones hemorroidales.

MODO DE EMPLEO:
La pomada de Thrombocid se aplica 3-4 veces al día, distribuyéndola suavemente para que penetre. Ordinariamente no hace falta vendaje, pero puede cubrirse con una compresa si es necesario. Si hay ulceraciones -por ejemplo, varicosas- aplicar la pomada alrededor y cubrir la lesión con una compresa sobre la que se ha extendido pomada de Thrombocid o una pomada antibiótica en los casos en que exista infección. La mejoría suele obtenerse con 3-4 días de tratamiento, pudiéndose entonces continuar con dosis menores, por ejemplo, una aplicación diaria.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO:
Dadas las características de este producto no existe posibilidad de intoxicación con su empleo terapéutico.

CONTRAINDICACIONES:
No existen, salvo la sensibilidad alérgica a sus componentes.

INCOMPATIBILIDADES:
No existen incompatibilidades farmacológicas para esta pomada.

EFFECTOS SECUNDARIOS:
No existen, salvo caso de sensibilidad alérgica a sus componentes, manifestada en forma de reacción local.

PRESENTACION:
Tubo con 20 g P.V.P.-I.V.A. 219,- Ptas. Tubo con 50 g P.V.P.-I.V.A. 303,- Ptas.